

本中心其他服務包括:

- ※ 幼針管抽取活組織檢驗
- ※ 俯臥式乳房立體定位組織穿刺檢查
- ※ 乳房膿瘡切開及引流手術
- ※ 乳房腫瘤切除手術
- ※ 保留乳房治療術
- ※ 改良根治性乳房切除手術
- ※ 前哨淋巴結活檢術
- ※ 腋下淋巴切除手術
- ※ 化學治療、標靶治療

參考資料: www.21.ha.org.hk/smartpatient

生效日期: 二零二二年三月

PFE-EPI-1-C010



電話: (852) 22003434

網址: www.sth.org.hk

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
 - ※宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

乳房組織穿刺檢查

Breast Tru-cut Biopsy

Examination Information

程序簡介



乳房組織穿刺檢查



乳腺診斷治療中心

聖德肋撒醫院 北座一樓

電話:(852) 2200 3310

辦公時間: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

簡介

乳房組織穿刺檢查是利用穿刺針在局部麻醉下抽取乳房腫瘤樣本作活組織化驗。

檢查前準備

- 需簽署手術同意書
- 依指示停用薄血藥，避免服用容易導致出血的中藥
- 檢查前須禁食 4-6 小時或遵醫囑指示
- 宜穿著寬鬆的衣服，不適宜穿著連身衣服

檢查過程

- 檢查在局部麻醉下進行
- 醫生會在抽取組織位置的皮膚注射局部麻醉藥，然後利用小刀在皮膚上作一小切口
- 經切口放入穿刺針抽取樣本作活組織化驗
- 一般抽取三至四個樣本
- 傷口需按壓五分鐘止血，然後敷上壓力敷料

檢查後須知

- 首 24 小時傷口敷上壓力敷料作加壓止血
- 首 24 小時只可抹身，應保持傷口乾爽
- 24 小時後可自行除去壓力敷料，保留防水膠布
- 傷口一般於檢查後 2 至 3 天癒合，屆時可自行除去防水膠布
- 傷口部位出現瘀青屬常見現象，此情況一般於檢查後 7 至 10 天逐漸消失
- 如傷口疼痛，請依照醫生處方服食止痛藥

麻醉併發症

- 即使屬罕有情況，但局部麻醉藥有可能會導致嚴重併發症

檢查併發症

- 傷口疼痛或受感染
- 穿刺部位出血或積聚瘀血
- 抽取組織不足或位置偏差，需再次接受檢查

* 如有查詢，請與你的醫生聯絡

聖德肋撒醫院, 太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk