

## 可能出现的并发症:

其实支气管内视镜检查是一个安全的检查,在检查过程中可能引起的并发症:

- ◇ 轻微气胸(1%,可自行消失)
- ◇ 轻微咳血
- ◇ 轻微发烧或纵隔发炎(少于1%)
- ◇ 严重气胸(0.5%,需要引流治疗)
- ◇ 严重咳血(0.2%)
- ◇ 死亡危机,少于0.1%

如有心肺功能不良、高龄、肾衰竭等病者,危险会增加。

\*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority  
October 2021 (Reviewed)  
PFE-EPI-9-S013



- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
  - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
  - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
  - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
  - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
  - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital  
聖德肋撒醫院

## 支气管内视镜检查

Health Information

健康信息

## 支气管内视镜检查

是一个诊断及治疗胸肺疾病的常见方法，支气管内视镜检查的原因包括：

- 原因不明的呼吸系统病的病征，例如：持续性咳嗽或咳血、声线改变。
- 肺部 X 光片显示有异常，需作进一步检查。
- 异物误入气管。
- 持续性肺部感染。
- 浓痰积聚而导致肺陷落。

### 检查过程：

- 1) 病人喉部先被喷上局部麻醉药，然后注射适量的镇静剂
- 2) 医生会用一条约五毫米粗的软管从病人的口腔，经过咽喉进入气管，直接观察及检查气管及支气管。
- 3) 医护人员会严密观察你的生命表证、血压、脉搏和血氧饱和度等，有需要时会给予额外氧气。

- 4) 如有需要，医生会按需要而抽取肺部的分泌，进行幼针穿刺或钳取少量气管或肺部组织作进一步化验。
- 5) 检查期间，病人或会咳嗽，此乃正常反应，应尽量放松，如常呼吸，则有助检查顺利进行。
- 6) 一般来说，整个内视镜检查需时 30-60 分钟，在一些复杂的个案，所需之时间将会更长。

### 检查前准备：

- ※ 作有关的血液化验或肺功能测试。
- ※ 照肺部 X 光片或计算机扫描。
- ※ 病人须于内视镜检查前六小时禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血压或怀孕等，须告诉医护人员并听从其指示服药。
- ※ 病人亦应提供现所服用药物及任何过敏反应数据。

- ※ 门诊病人不宜亲自驾驶前来；应避免在检查前酗酒、抽烟或服用不当份量的镇静药物。年老、行动不便的病人宜由家人陪伴前来检查。

### 检查后注意事项：

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉喷剂，病人检查后尚须禁食两小时，以待喉部麻醉药或镇静剂药力减退后才可进食。
- ※ 病人于检查后，或会接受 X 光检查。
- ※ 检查后会有轻微喉痛、声嘶及痰液有少量血丝。
- ※ 病人接受镇静剂注射后会有头晕感觉，应卧床休息，待药力过后才可起床走动；并整天不可操作重型机器或驾驶，以防意外发生。
- ※ 病人应主动查询检查结果及日后覆诊日期，并依照医护人员指示完成药物疗程。