

可能出现的并发症：

- ◇ 主要是小便疼痛、带血或发炎。
- ◇ 有时血块停滞于膀胱内引致排尿困难。
- ◇ 尿道狭窄乃长期后遗症。
- ◇ 膀胱穿孔、尿道受损或败血病 则较为罕见。

一般来说机会少于百份之十。如出现并发症，病人或需接受外科手术补救，严重者可导致病人死亡。各并发症发生之机会随着病人不同之情况、及治疗方法而有所差异，病人应主动询问主诊医生以明了详情。

*以上信息只供参考，并不能完峻反映医生意见，如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-S014



电话：(852) 22003434

网址：www.sth.org.hk

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线：2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士：1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富：可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角：可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台：B1 出口，可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士：(852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

软性膀胱内视镜检查

Health Information

健康信息

引言:

软性膀胱镜检查是用内窥镜经尿道进入膀胱内，从而清楚看见尿道、膀胱、输尿管入口等是否正常。

适应症:

一般由尿道及膀胱所引发的不适症。

检查过程:

- 1) 病人平卧或需挂起双脚。
- 2) 用带有麻醉成份的润滑剂注射入尿道。
- 3) 将软性膀胱镜经尿道进入膀胱。
- 4) 膀胱会有胀满的感觉。
- 5) 如有需要，会抽取组织检查或清洗膀胱等手术。
- 6) 通常检查需时十至十五分钟。

检查前准备:

- ※ 可正常饮食。
- ※ 将小便排清，使医生能清楚看见膀胱内之情况。

检查后注意事项:

- ※ 可正常饮食并多饮开水，以减少发炎机会。
- ※ 小便可能有少许疼痛或小便带血，此情况会逐渐减退。
- ※ 通常即日便可出院。
- ※ 最重要是多饮开水，每天饮水须多于 2 公升，但不要过量。

.....

