

可能出现的并发症:

较严重之并发症包括:

- ◇ 肠道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 心肺并发症
- ◇ 急性胆管炎及胰腺炎等

一般来说机会少于百份之五。如出现并发症,病人或需接受外科手术补救,严重者可导致病人死亡。

各并发症发生之机会随着病人不同之情况、及治疗方法而有所差异,病人应主动询问主诊医生以明了详情。

*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-S012




电话: (852) 22003434

网址: www.sth.org.hk

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富:可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角:可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台:B1 出口,可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院



内视镜逆行胰胆管 造影术

Health Information

健康信息

内视镜逆行胰胆管造影术

胰脏及胆管为深藏体内之重要器官。胰管汇集从胰脏分泌出之消化液，而胆管则负责将从肝脏制造之胆汁引流到小肠，两者经会合后，将一同被排进十二指肠。

对胰脏及胆管之疾病，一般体外所作之检查并未能准确得出答案。使用内视镜逆行胰胆管造影术，俗称胆管镜检查，医生能从十二指肠胆管开口处，逆方向地将导管放进胰管或胆管进行X光造形显影。

病人怀疑患有胰胆管闭塞(如因结石或肿瘤)、急性胆管炎、急性或慢性胰腺炎、手术后胰胆管渗漏等，胆管镜检查均能准确作出诊断，医生并能同时使用各类辅助仪器治疗胰胆管中之疾病。

检查过程：

- 1) 医生先给病人喉部喷上局部麻醉药，然后注射适量的镇静剂。
- 2) 医生随着将一支柔软，直径约为1.3公分之内视镜经口部放进病人十二指肠部位进行检查及治疗。
- 3) 视乎病人个别情况，一般来说，整个内视镜检查需时约30-60分钟。
- 4) 在一些复杂的个案而需要特别治疗者，所需之时间将会更长。
- 5) 检查期间病人多感到恶心及上腹胀胀不适。

检查前准备：

- ※ 病人须于胆管镜检查前六小时禁食。但对于一些病况危急的病人，则或需要紧急施行。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血压或怀孕等，须告诉医护人员并听从其指示服药。

- ※ 病人亦应提供现所服用药物及任何过敏反应数据。
- ※ 门诊病人不宜亲自驾驶前来；亦应避免在检查前酗酒、抽烟或服用不当份量的镇静药物。年老、行动不便的病人宜由家人陪伴前来检查。

检查后注意事项：

- ※ 病人检查后待麻醉药或镇静剂药力减退后需按医嘱进食。
- ※ 病人如需要使用鼻胆管引流，则须小心保持其位置以防治疗失效。
- ※ 病人应主动查询检查结果及日后覆诊日期，并依照医护人员指示完成药物疗程。

.....