

聖德肋撒醫院

眼科中心

病人須知

白內障手術

手術前

- 患慢性疾病，如高血壓、糖尿病、心臟病、對藥物敏感等，請通知醫生
- 長期服藥者，應照常服藥
- 若服 Aspirin (亞斯匹靈)或其他薄血藥者，請通知醫生
- 不須戒口，應食營養豐富及易消化食物，多吃水果、蔬菜，防止便秘
- 不要喝酒、吸煙
- 手術前，要洗乾淨頭髮、剪指甲

手術當日

- 長期服藥者，請照常服藥，但 Aspirin (亞斯匹靈)及薄血藥除外
- 洗乾淨臉部
- 用局部麻醉進行手術，不須禁食，但不要進食太飽
- 不要穿過頭衣服，以免碰撞傷口
- 如有假牙，請先除下

請_____由家人陪同於_____月_____日_____午_____時_____分準時到

手術時

- 醫生會在眼部施行局部麻醉
- 手術時有知覺但不會痛
- 手術時盡量放鬆身體，不可隨意移動
- 臉部會用消毒布蓋著，但會確保空氣流通

白內障手術能引發的併發症

手術成功率非常高，但亦有小部份病人於手術後出現以下併發症：

- 如細菌感染，視力可能將會受損
- 青光眼、視網膜脫落、出血、角膜水腫等，但可進一步用藥物或手術治療
- 晶體後囊或有可能續漸變厚，視力便會漸變模糊，在這情況下，可作簡單的激光治療 (YAG LASER) 便能回復視力

參考資料

1. 醫院管理局- 智友站 Retrieve, 2012 from
http://www.ekg.org.hk/pilic/public/Ophthal_PILIC/Ophthal_CataractOperationandIntraOcularLensImplantation_0065_chi.pdf