

圣德肋撒医院
眼科中心

病人须知
荧光造影或靛花青眼底血管造影

简介

荧光造影或靛花青眼底血管造影是用作检查视网膜(眼底)血管状况，并不是手术。将荧光素或靛花青作静脉注射后，透过血液循环，将眼底血管显现以助医生作出更准确的诊断及治疗。

注意事项：

1. 孕妇不宜作此项检查。
2. 荧光素或靛花青可能引致敏感反应，轻微的会有恶心、呕吐或出疹现象。严重的药物反应比较罕见，因此病人如对食物或药物有过敏反应，请通知医生，以作出相应的安排。检查当日，请依时携同家人或朋友陪同下作检查准备。

检查前：

1. 可如常进食，无须禁食。
2. 需将眼瞳孔扩张才进行检查。

检查时：

1. 造影剂须经静脉注射进入血管，连接闪光灯之眼底摄影机会摄取一连串之相片，需时通常不超过十五分钟检查完成。

检查完成后：

1. 若病人稍作休息后并无不妥，即可在家人陪同下回家。
2. 由于曾使用扩瞳眼药水，视力会短暂模糊，所以不宜驾驶。可佩戴太阳眼镜以减轻畏光现象。
3. 因荧光剂会随尿液排出体外，所以检查后 24-36 小时内小便呈橙黄色，宜多喝水。
4. 皮肤及结膜即眼白亦可能发黄迹象，但会在 6-12 小时后消失，毋须惊慌。

请_____于_____年_____月_____日_____午_____时_____分
到_____约见_____医生覆诊

参考数据

1. 医院管理局- 智友站 Retrieve, 2012 from <http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/EYE-10.pdf>

STHEC

Revised on Oct 2022