

溫馨提示

- ◇ 請提前預約檢查。
- ◇ 請攜帶醫生轉介信，身份證/護照或有效的香港旅遊簽證於檢查前 15 分鐘到本中心登記。
- ◇ 如未能出席，請在辦公時間上午 8 時至下午 4 時致電通知本中心。
- ◇ 當黑色暴雨警告生效 / 八號或以上風球懸掛，請聯絡本中心，以便重新安排檢查日期。
- ◇ 另設有多項健康檢查計劃，詳情請查看本院網站。

參考資料: www.21.ha.org.hk/smartpatient

生效日期: 二零二二年三月一日

PFE-EPI-3-C014



電話: (852) 22003434

網址: www.sth.org.hk

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

傾斜床測試

Tilt Table Test

Examination Information

程序簡介



傾斜床測試



體檢及診斷中心

聖德肋撒醫院主樓一樓

電話:(852) 2200 3155

辦公時間: 08:00-16:00 (星期一至星期六)

簡介

傾斜床測試常用於測試一些曾多次無故昏厥的病人。透過測試可以診斷出如血管迷走神經性暈眩等病因。

測試時透過傾斜床，病人的身體將會維持在傾斜狀態，體內靜脈血液會因地心吸力而積聚於腿部，而回流至心臟的血液亦相對地減少。在正常的生理狀態下體內神經會作出相對的調整，心跳和血壓會增加，間接促進血液回流。但患有血管迷走神經性暈眩的病人心跳或血壓會不增反減，引致昏厥，檢查過程需時1-2小時。

檢查前準備

1. 禁食四至六小時。
2. 醫護人員會解釋測試的目的，過程和風險，受檢查者明白後需簽署同意書。並按醫生指示停用需要暫停的藥物。
3. 醫護人員會為病人置入靜脈導管，需要時按醫生指示注射藥物。
4. 門診病人請安排親友陪同。

測試過程

1. 病人首先躺臥在傾斜床上並扣上固定帶，接駁監察儀器以便監察心律、血壓和血含氧量。
2. 傾斜床會緩緩地被調節至大約傾斜 60-80 度，病人的身體會維持在這個角度大約 30-60 分鐘。醫護人員會密切觀察病人的生命表徵。如基本測試呈陰性結果，醫護人員會利用藥物幫助引發昏厥，再進行餘下的 30 分鐘測試。
3. 如經過 30 分鐘後仍然沒有症狀，測試結果便是陰性。
4. 測試期間，病人需保持心境平靜，以便觀察有否暈眩、噁心、出汗或昏厥等症狀出現。
5. 過程中如出現以上症狀而同時病人的心跳和血壓呈現相應的變化，測試結果便是陽性。這時病人會盡快被調校至平臥的位置。直至神智清醒，心跳和血壓回復正常，整個測試便完成。

測試後護理

1. 測試將會由醫生與護士一同進行監測。
2. 測試後需休息 20-30 分鐘，待生命表徵回復正常，得到醫護人員同意方可離開。
3. 當醫護人員確定您的血壓及心律回復正常後，您才能離開檢查室。

風險

1. 此檢查有一定風險。
2. 風險包括暫時性心臟停頓(> 5 秒)。
3. 測試過程所使用的藥物可引致心跳紊亂及突發心臟病。

如有任何查詢，歡迎致電本中心或與你的醫生聯絡。

聖德肋撒醫院, 太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk