



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

填充劑注射 Filler Injection

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154

參考資料:

美國食品藥品監督管理局

最後更新日期: 1/02/2022

PFE-EPI-5-C012

皮膚激光及整形外科中心
Skin Laser & Plastic Surgery Centre



填充劑注射

皮膚激光及整形外科中心

聖德肋撒醫院東座一樓

電話:(852) 2200 3211

辦公時間: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

簡介

真皮填充物是一種無菌的，穩定性非動物的透明質酸。其注射性凝膠，容易為人體組織接受，亦與人體自然產生的透明質酸相似。它的功效持久，但非永久。

醫生可依據每個人的特殊需要而注射於不同部位，可以用來撫平面部幼紋及皺紋、豐唇及面部塑形。填充劑注射雖然無法阻止衰老，但能減少皺紋和軟質組織凹陷的情況。此外，因填充物會慢慢被人體吸收，故欲維持其注射後的效果就必須重複治療。至於注射效果的長短則因人而異。一次療程約需時 15-30 分鐘。

注射前準備

應停止服用任何血液稀釋藥物，例如：阿斯匹靈、華法林、或某些維生素補充劑等。因這些藥物可能會令注射部位增加瘀傷或出血的機會。

注射過程

1. 醫生會與你商討治療的期望，解釋治療的目的，過程和風險，明白後需簽署同意書。
2. 請徹底清潔臉部。
3. 我們會為你在治療前拍攝照片作臨床之用。
4. 請詳細告知你的過敏及醫療紀錄。
5. 醫生會使用極細小針頭少量地注射填充劑到你的皮膚，以填平皺紋或增加組織容量。若有不適或異常感覺，必須立即告訴醫生。

注射後須知

一般過敏反應有輕微的紅點、腫脹、發癢、瘀青與疼痛，這些反應不會很嚴重，一般會在注射後數天至一星期內消失。不過有些人反應會持續較長。若不適持續，或出現其他反應，便應立即看醫生。在接受注射後數小時內，應避免按壓治療部位。若有需要的話，可以冷敷舒緩治療部位。

注射後的護理指引

- 不要過度按壓注射位置。
- 盡量避免劇烈運動、曬太陽浴或暴露於極熱之氣溫下。
- 避免飲酒。
- 使用清水或溫和的潔膚用品清潔臉部。
- 使用溫和及不含藥性的潤膚膏保護皮膚。

- 日間及進行戶外活動前要塗上防曬膏，防曬度數最少要有 SPF50 或以上(防紫外光 B)及 PA++++(防止紫外 A)。

風險

注射填充劑並無嚴重的副作用，但在注射過程中及恢復時期，還是有極少數的風險和併發症。

- ※ 輕微紅點，出血，瘀斑，腫脹，疼痛，癢癢和麻痺
- ※ 皮膚凹凸不平或不對稱現象
- ※ 損傷深層結構或組織壞死
- ※ 感染
- ※ 過敏反應或敏感性增加
- ※ 疤痕
- ※ 移位
- ※ 肉芽腫/膿腫

*如有任何查詢，歡迎致電本中心。

聖德肋撒醫院，
太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk