



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

填充剂注射 Filler Injection

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154

参考数据:

美国食品药品监督管理局

最后更新日期: 1/02/2022

PFE-EPI-5-S012

皮肤激光及整形外科中心
Skin Laser & Plastic Surgery Centre



填充剂注射

皮肤激光及整形外科中心

圣德肋撒医院东座一楼

电话: (852) 2200 3211

办公时间: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

简介

真皮填充物是一种无菌的, 稳定性非动物的透明质酸。其注射性凝胶, 容易为人体组织接受, 亦与人体自然产生的透明质酸相似。它的功效持久, 但非永久。

医生可依据每个人的特殊需要而注射于不同部位, 可以用来抚平脸部幼纹及皱纹、丰唇及脸部塑形。填充剂注射虽然无法阻止衰老, 但能减少皱纹和软质组织凹陷的情况。此外, 因填充物会慢慢被人体吸收, 故欲维持其注射后的效果就必须重复治疗。至于注射效果的长短则因人而异。一次疗程约需时 15-30 分钟。

注射前准备

应停止服用任何血液稀释药物, 例如: 阿司匹林、华法林、或某些维生素补充剂等。因这些药物可能会令注射部位增加瘀伤或出血的机会。

注射过程

1. 医生会与你商讨治疗的期望, 解释治疗的目的, 过程和风险, 明白后需签署同意书。
2. 请彻底清洁脸部。
3. 我们会为你在治疗前拍摄照片作临床之用。
4. 请详细告知你的过敏及医疗纪录。
5. 医生会使用极细小针头少量地注射填充剂到你的皮肤, 以填平皱纹或增加组织容量。若有不适或异常感觉, 必须立即告诉医生。

注射后须知

一般过敏反应有轻微的红点、肿胀、发痒、瘀青与疼痛, 这些反应不会很严重, 一般会在注射后数天至一星期内消失。不过有些人反应会持续较长。若不适持续, 或出现其他反应, 便应立即看医生。

在接受注射后数小时内, 应避免按压治疗部位。若有需要的话, 可以冷敷纾缓治疗部位。

注射后的护理指引

- 不要过度按压注射位置。
- 尽量避免剧烈运动、晒太阳浴或暴露于极热之气温下。
- 避免饮酒。
- 使用清水或温和的洁肤用品清洁脸部。
- 使用温和及不含药性的润肤膏保护皮肤。

- 日间及进行户外活动前要涂上防晒霜, 防晒度数最少要有 SPF50 或以上 (防紫外光 B) 及 PA++++ (防止紫外 A)。

风险

注射填充剂并无严重的副作用, 但在注射过程中及恢复时期, 还是有极少数的风险和并发症。

- ※ 轻微红点, 出血, 瘀斑, 肿胀, 疼痛, 瘙痒和麻痹
- ※ 皮肤凹凸不平或不对称现象
- ※ 损伤深层结构或组织坏死
- ※ 感染
- ※ 过敏反应或敏感性增加
- ※ 疤痕
- ※ 移位
- ※ 肉芽肿/脓肿

*如有任何查询, 欢迎致电本中心。

圣德肋撒医院,
太子道 327 号

电话: (852)-22003434

网址: www.sth.org.hk